

WZW TYPU A

DROGI PRZENOSZENIA



OBJAWY

- grypopodobne (w pierwszej fazie)
- gastryczne - bóle brzucha, wymioty, biegunka
- żółtaczką

OKRES WYLĘGANIA



OD 15 DO 50 DNI (PRZEWAŻNIE OK. 30 DNI)

ZAPOBIEGANIE

Przestrzeganie zasad higieny osobistej (mycie rąk przed posiłkiem i po wyjściu z toalety).

Utrzymywanie właściwych warunków sanitarno – higienicznych przygotowywania i dystrybucji posiłków.

Unikanie przygodnych kontaktów seksualnych zwłaszcza podczas pobytu w krajach endemicznego występowania zakażeń WZW typu A.

Szczepienia

SZCZEPIENIA

W Polsce zarejestrowane są trzy szczepionki monowalentne przeciwko WZW typu A (Avaxim, Havrix, Twinrix). Wymagają one podania 2 dawek w optymalnym odstępie 6 do 12 miesięcy. Skuteczność szczepionki po podaniu pierwszej dawki wynosi 95 %, po podaniu dwóch dawek sięga 100 %.

Szczepienie zalecane jest m.in osobom pracującym przy produkcji i dystrybucji żywności, obsłudze urządzeń kanalizacyjnych, pracownikom służb komunalnych a także osobom planującym wyjazdy do krajów o dużej zapadalności na WZW typu A.