


KOMUNIKAT
Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
w sprawie zachorowań na inwazyjną chorobę pneumokokową
w województwie pomorskim

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje o zwiększonej zapadalności mieszkańców województwa pomorskiego na inwazyjne zakażenia pneumokokowe w stosunku do średniej zapadalności w Polsce (wykres poniżej).

Zapadalność na pneumokokowe zakażenia inwazyjne na 100 tys. osób w województwie pomorskim i w Polsce w latach 2005 – 2016.



Wśród chorych przeważają osoby w starszych grupach wiekowych, w szczególności po 40 roku życia. Śmiertelność w 2015 r. oraz 2016 r. wyniosła odpowiednio 22 % i 21 % (szczegóły w tabeli poniżej).

Grupa wiekowa	Rok 2015		Rok 2016	
	zachorowania	zgony	zachorowania	zgony
Od 0 do 9	8	-	9	1
Od 10 do 19	1	-	1	-
Od 20 do 29	4	-	5	1
Od 30 do 39	5	1	3	-
Od 40 do 49	15	6	20	5
Od 50 do 59	37	6	25	4
Od 60 do 69	43	7	40	6
70 i powyżej	54	17	42	14
RAZEM	167	37	145	31

Powyższe dane obejmują jedynie inwazyjne choroby wywołane przez *Streptococcus pneumoniae* (pneumokoki) tj. przypadki sepsy (posocznicy) i/lub zapaleń opon mózgowo – rdzeniowych. Inne zachorowania o etiologii *Streptococcus pneumoniae*, jak np. zapalenia płuc, ucha środkowego, zatok obocznych nosa, wsierdzia, czy stawów mogą mieć ciężki przebieg kliniczny i poważne powikłania.

Najskuteczniejszą metodą zapobiegania zakażeniom pneumokokowym są szczepienia ochronne. **Szczepionka PCV13 jest zarejestrowana zarówno dla dzieci, jak i osób dorosłych.**

Od 2017 r., zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1815), zostały wprowadzone do Programu Szczepień Ochronnych szczepienia przeciwko pneumokokom dla wszystkich dzieci w pierwszym roku życia. Pozytywne efekty programu powinny być widoczne w perspektywie najbliższych lat.

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny pragnie zwrócić uwagę, że zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych, szczepienia przeciwko pneumokokom są rekomendowane **przede wszystkim dla osób po 50 roku życia** oraz dla dzieci i osób dorosłych z zaburzeniami odporności oraz obciążonymi chorobami przewlekłymi.