

INFEKCJA ROTAWIRUSOWA

FAKTY



Infekcja rotawirusowa to najczęstsza przyczyna biegunek u dzieci do lat 5. W województwie pomorskim w 2018 r. zarejestrowano ponad 2500 zakażeń rotawirusowych. Ponad 90 % osób wymagało hospitalizacji. Największą zapadalność stwierdzono w grupie wiekowej do 1 roku życia (25-26 zachorowań na 1000 dzieci).



Zakażenie przenosi się drogą kropelkową, przez brudne ręce przedmioty lub żywność.



Okres wylegania wynosi od 12 do 96 godzin

GŁÓWNE OBJAWY



Ból brzucha



Biegunka



Wymioty

ZAPOBIEGANIE



Przestrzeganie zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk, w szczególności:



- przed posiłkiem



- po skorzystaniu z toalety



- po zabawie i powrocie do domu

Szczepienia ochronne



W Polsce dostępne są dwa rodzaje szczepionki podawanej doustnie: jednoskładnikowa oraz pięcioskładnikowa

Szczepienia należy rozpocząć u niemowląt w wieku od 6 do 12 tygodnia życia, u których nie występują przeciwwskazania do podania żywych szczepionek. Szczepienie szczepionką jednoskładnikową składa się z 2 dawek podanych doustnie w odstępie przynajmniej 4 tygodni. Drugą dawkę szczepienia powinno się podać przed upływem 24 tygodnia życia, a najlepiej przed upływem 16 tygodnia życia. Szczepienie szczepionką pięcioskładnikową składa się z 3 dawek podanych doustnie również w odstępie przynajmniej 4 tygodni. Zaleca się, aby pierwszą dawkę szczepionki podać przed 12 tygodniem życia. Ostatnią dawkę szczepionki powinno się podać najpóźniej do 32 tygodnia życia. Szczepienia przeciwko rotawirusom są szczepieniami zalecanymi (nierefundowanymi z budżetu)

w materiale wykorzystano rysunki WikiHow i Pixabay