



# Świnka w województwie pomorskim

## LICZBA ZAREJESTROWANYCH PRZYPADKÓW ŚWINKI W 2015 I 2016 ROKU



Dane za III kwartał 2016 r. dotyczą lipca i sierpnia


## ZAPADALNOŚĆ NA 100 000 OSÓB NA ŚWINKĘ W 2016 W POWIATACH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO (OD STYCZNIA DO SIERPNI WŁĄCZNIE)



LICZBA PRZYPADKÓW ZACHOROWAŃ NA ŚWINKĘ W 2016 W POWIATACH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO (OD STYCZNIA DO SIERPNI)


Powiat	Liczba przypadków
Gdańsk	13
Gdynia	8
Sopot	1
Słupsk	4
bytowski	5
chojnicki	0
człuchowski	2
gdański	4
kartuski	12
kościerski	2
kwidzyński	4
łęborski	4
malborski	3
nowodworski	3
pucki	2
słupski	7
starogardzki	2
sztumski	4
wejherowski	3
tczewski	11

ZACHOROWANIA NA ŚWINKĘ W 2016 R. WG PŁCI, GRUPY WIEKOWEJ Z UWZGLĘDNIENIEM STANU ZASZCZEPIENIA

Płeć	Stan zaszczepienia	Grupa wiekowa								RAZEM
		0	Od 1 do 4	Od 5 do 9	Od 10 do 14	Od 15 do 19	Od 20 do 24	Od 25 do 29	30 i powyżej	
	1 dawka*		9	13	4	2				<b>27</b>
	2 dawki*			3	10					<b>14</b>
	Nieszczepiony		2	3	1			3	5	<b>14</b>
	Brak danych					1				<b>1</b>
	1 dawka*		5	7	1					<b>13</b>
	2 dawki*				4	1				<b>5</b>
	Nieszczepiony	1	1	2			2	1	10	<b>17</b>
	Brak danych		1	1			1			<b>3</b>
<b>RAZEM</b>		<b>1</b>	<b>18</b>	<b>29</b>	<b>20</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>15</b>	<b>94</b>

\* - Aktualny Program Szczepień Ochronnych przewiduje podanie pierwszej dawki szczepionki MMR (przeciwko śwince, odrze i różyczce) w 13 – 14 miesiącu życia, a drugą w 10 roku życia.

ZAPADALNOŚĆ NA 100 000 OSÓB NA ŚWINKĘ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM I ŚREDNIA ZAPADALNOŚĆ W POLSCE W LATACH 2001-2015



	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Zapadalność w woj. pomorskim	47,4	40,9	406	403	53,3	10,5	6,2	6,2	5,5	5,4	4,8	8,5	7,6	9,4	6,7
Średnia zapadalność w Polsce	43,3	105	229	354	188,5	39,6	10,9	8,6	7,7	7,2	6,7	7,2	6,3	6,5	5,7

Zapadalność na świnkę w województwie pomorskim od 2007 r. utrzymuje się na niskim poziomie. Wcześniej zapadalność była wyższa, a dodatkowo co 2-4 lata obserwowano cykle epidemiczne podczas których zapadalność wzrastała zdecydowanie, np. w latach 2003 – 2004. Spadek zapadalności należy zawdzięczać wprowadzeniu obowiązkowego szczepienia przeciwko śwince. W 2004 roku obowiązkiem szczepienia podstawowego szczepionką trójwalentną przeciwko odrze, śwince i różyczce objęto wszystkie dzieci (dziewczynki i chłopcy) w 13-14 miesiącu życia, a dodatkowo w 2006r. wprowadzono szczepienie przypominające dla dzieci w 10 roku życia.