

Borelioza z Lyme w województwie pomorskim w okresie od 1 stycznia do 31 lipca 2017 r.

W województwie pomorskim w ostatnich latach zgłaszalność przypadków boreliozy stale rośnie.

Liczba przypadków zachorowań w woj. pomorskim w latach 2001-2016 oraz od 1 stycznia do 31 lipca 2017 r.




W okresie od stycznia do końca lipca 2017 r. zapadalność na boreliozę z Lyme w województwie pomorskim (28,6 na 100 tys. osób) była nieco większa od zapadalności w Polsce (25,9 na 100 tys. osób). Należy podkreślić, iż w ubiegłych latach liczba zachorowań w pierwszej połowie roku była zdecydowanie mniejsza niż w drugiej.

Liczba przypadków boreliozy w poszczególnych kwartałach w 2015, 2016 oraz 2017 r. w województwie pomorskim.

Rok	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
2015	148	145	250	342
2016	126	197	468	524
2017	263	244	151 (lipiec)	

Największą zapadalność na 100 tys. osób w okresie od stycznia do końca lipca zanotowano wśród mieszkańców powiatu bytowskiego (126) oraz kościerskiego (117). Poniższa mapa przedstawia poziom zapadalności oraz liczby przypadków w poszczególnych powiatach (przy wykresach).



W części zachorowań na boreliozę udało się ustalić gminę, w której doszło do ukąszenia przez kleszcza. Poniższa mapa przedstawia miejsca, w których dochodziło do ukąszeń przez kleszcza skutkujących zachorowaniem na boreliozę w okresie od 1 stycznia do 31 lipca 2017 r. w gminach województwa pomorskiego (z podaniem liczby pokąsań).

