


INFORMACJE NA TEMAT ODRY

Odra to ostra, wirusowa choroba zakaźna, która bardzo łatwo się rozprzestrzenia wśród nieodpornionych osób w każdym wieku drogą kropelkową albo powietrzno-kropelkową.



Chory człowiek może być źródłem zakażenia innych osób w okresie **5 dni** przed i **3 dni** po wystąpieniu wysypki. W przypadku odry nie ma nosicielstwa. Przechorowanie odry powoduje trwałą odporność.

POWIKŁANIA

Odry nie należy lekceważyć ponieważ powikłania zachorowania mogą być bardzo groźne. Najczęstsze powikłania to:



zapalenie ucha środkowego, które może prowadzić do utraty słuchu,



biegunka,




zapalenie płuc,



ostre zapalenie mózgu i/lub opon mózgowo-rdzeniowych. Bardzo ciężkim następstwem przebytej odry, które może wystąpić nawet kilka-kilkanaście lat po zakażeniu, jest podostre stwardniające zapalenie mózgu.

ZAPOBIEGANIE

Sposobem zapobiegania odrze są szczepienia ochronne realizowane w formie dwóch dawek. Skuteczność szczepionki jest bardzo wysoka.




W Polsce powszechne obowiązkowe szczepienia przeciwko odrze wprowadzono w **1975** roku dla dzieci w 13-15 miesiącu życia. Do szczepień podchodzono nieufnie, dlatego dopiero w latach 90 - tych odsetek dzieci szczepionych zgodnie z kalendarzem szczepień przekroczył 75%.

Do roku **1990** szczepienie obowiązkowe było wyłącznie jedną dawką. W roku **1991** wprowadzono dawkę przypominającą.

Od 2004 roku standardowe szczepienie przeciwko odrze w Polsce wykonywane jest przy użyciu skojarzonego preparatu szczepionkowego przeciwko odrze, śwince i różyczce. Pierwsza dawka podawana jest w drugim roku życia dziecka, dawka przypominająca w 10 roku życia. Od 2019 roku dawka przypominająca będzie podawana wcześniej, tj. w 6 roku życia.

Osoby dorosłe, które nie chorowały na odrę, nie były szczepione lub nie pamiętają czy były szczepione, mogą się zaszczepić przeciwko odrze we własnym zakresie



W niektórych przychodniach można kupić szczepionkę na miejscu. Szczepienia pracowników może sfinansować pracodawca w ramach medycyny pracy. Pracownicy mogą być szczepieni również w przychodniach do których należą.



72 godz.

W przypadku narażenia na zachorowanie czyli kontaktu z chorym na odrę, osoby nieszczepione lub uodpornione 1 dawką szczepionki przeciwko odrze mogą zostać profilaktycznie zaszczepione w ciągu 72 godzin.